

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 21 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii

GANDACUL DIN COLORADO (LEPTINOTARSA D.), AFIDE

(Myzus persicae, Aphis spp., Macrosiphum e.) + MANA

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

CARTOF

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:.....

La depistarea daunătorului

1 exemplar la 4 – 5 tufe de cartof

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

INSECTICID:

1. LASR 240 SC – 0,1 L/ha sau;
2. CORAGEN – 50 ml/HA sau;
3. KARATE ZEON (NINJA) – 0,2 L/HA sau;
4. SCATTO – 0,4 L/HA sau;
5. MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) – 0,100 KG/HA sau
6. CYPERGUARD 25 EC (CATAPULT) - 0,08 L/HA

+

FUNGICID (mana):

1. ELECTIS75 WG – 1,5 – 1,8 KG/HA sau
2. INFINITO 687,5 SC – 1,4 L/HA sau
3. ZORVEC ENICADE – 0,15 L/HA sau
4. EQUATION PRO – 0,4 KG/HA sau
5. CUPERTINE SUPER (COMBIDUO COBRE) – 3,5 KG/HA sau
6. CURZATE MANOX – 2,5 KG/HA

sau alte produse omologate recomandate in lista oficiala

PEST-EXPERT – <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola este **quest**)

Alte recomandari: Perioada optima de tratament dureaza 5 – 6 zile de la depistare. Al doilea tratament se repeta dupa 10 – 14 zile cu alt produs. Nu se trateaza la temperaturi peste 25°C.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 22 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii
ANTRACNOZA FASOLEI (Colletotrichum l.), ARSURA COMUNA(Xanthonomus p.),
BACTERIOZE COMUNE + PADUCHELE NEGRU (Aphis f.),
GARGARITA FASOLEI (Acanthoscelides o.)

.....
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....
FASOLE

.....
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:.....

TRAT. 1 – înainte de înflorire
TRAT. 2 – după înflorire, apariția primelor pastai
TRAT. 3 – se aplică la 10 – 12 zile de la trat. 2

.....
Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. ALCUPRAL 50 PU – 0,25% (2,5 KG/HA) sau ;
2. MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG) – 0,15% (0,9 KG/HA in 600 L apa) sau
3. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau
4. AMISTAR (MIRADOR 250 EC) – 0,75 – 1,0 L/HA sau

+

1. ALFAMETRIN 10 EC (ALFADONE 10 EC) - 0,10 L/HA sau
2. DELTAM - 5,0 ml in 10 l apa / 100 mp.

sau alte produse omologate recomandate in lista oficiala
PEST-EXPERT – <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola este quest)

Alte recomandari: Nu se trateaza la temperaturi peste 25°C.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor și a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare respectiv: Ordonanta Guvernului nr. 4/1995, Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administratie Locala și nr. 127/21.10.1991 al Asociatiei Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine.

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 23 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii
..... **BOLI FOLIARE – Tratam. 2.....**
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

CEREALE PAIOASE

.....
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe
care s-au realizat următoarele condiții:.....

**Tratamentul se execută când peste 10% din plante sunt atacate –
faza de burduf până la degajarea spicului**

.....
Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. MYSTIC PRO (ARES PRO - a doua denumire comercială) – 1,0 L/HA sau;
2. ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) – 0,5 L/HA sau ;
5. NATIVO 300 SC (TWIST PLUS) – 0,8 L/HA sau;
6. FALCON PRO (IMPULSE PRO 425 EC) – 0,6 L/HA sau
7. MIRADOR FORTE EC – 2,0 L/HA sau
8. EVOLUS – 0,75 - 1,0 L/HA sau
9. MAGNELLO – 1,0 L/HA

.....
sau alte produse omologate recomandate în lista oficială
PEST-EXPERT – <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola este **quest**)

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

**Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a
muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.**

*In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislația națională în vigoare
respectiv: Ordonanța Guvernului nr. 4/1995, Ordonanța Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul
comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al
Departamentului pentru Administrație Locală și nr. 127/21.10.1991 al Asociației Crescătorilor de
Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor
cu pesticide, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de " înflorire", pentru a asigura
protecția familiilor de albine.*

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 24 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii
MUSCA VERZEI (CHORTOPHILA BRASSICAE) + alti daunatori la varza

.....
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

VARZA

.....
Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții.....

LA APARIȚIA DAUNĂTORULUI

.....
Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. DECIS 25 WG – 0,005% (30 g/ha) sau
2. LASER 240 SC – 0,03% sau
3. AFFIRM – 1,5 kg/ha sau
4. KARATE ZEON (NINJA) – 0,015% (0,09 l/ha) sau
5. BENEVIA – 0,4 – 0,5 L/ha sau
6. SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD) – 0,15 L/HA sau
7. FASTER 10 CE – 0,03%

.....
sau alte produse omologate recomandate în lista oficială PEST-EXPERT –
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola este quest)

Alte recomandări: Tratamentul se repetă după 7 – 8 zile.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislația națională în vigoare respectiv: Ordonanța Guvernului nr. 4/1995, Ordonanța Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și nr. 127/21.10.1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de " înflorire", pentru a asigura protecția familiilor de albine.

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 25 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii
.....**VIERMELE PRUNELOR (LASPEYRESIA FUNEBRANA), AFIDE, ACARIENI,
OMIZI DEFOLIATOARE + monilia, patarea rosie, ciuruire**
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

PRUN

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe
care s-au realizat următoarele condiții.....

Fruct cu diametrul de 1,0 – 1,5 cm

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. FASTER 10 CE – 0,025% (0,250 l/ha in 1000 l apa) sau;
 2. POLECI (DECA 2,5 EC) – 30 – 50 ml / hl apa (0,03 – 0,05%) sau ;
 3. CORAGEN – 100 ml/ha sau
 4. LASER 240 SC – 0,6 l/ha sau
 5. KARATE ZEON (NINJA – a doua denumire comerciala) – 0,015%
- +
1. SIGNUM (SYREX STAR) – 0,5 kg/ha sau
 2. FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) – 0,75 l/ha sau
 3. LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha sau
 4. ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) – 0,075 – 0,1% (0,075 – 1,0 l/ha in 1000 l apa)

sau alte produse omologate recomandate in lista oficiala

PEST-EXPERT – <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola este **quest**)

Alte recomandari: Tratamentul se va termina in 4 – 5 zile; se va repeta tratamentul după
8 -10 zile. Nu se trateaza la temperaturi peste 25°C. Pasunatul interzis 21 zile. In plantatiile
unde se constata prezenta acarienilor se va folosi un acaricid impreuna cu amestecurile de
mai sus.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

**Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a
muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.**

*In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare
respectiv: Ordonanta Guvernului nr. 4/1995, Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul
comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al
Departamentului pentru Administratie Locala si nr. 127/21.10.1991 al Asociatiei Crescatorilor de
Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor
cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura
protectia familiilor de albine.*

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 26 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii
PLOSITA CEREALELOR (EURYGASTER SP.) - LARVE

.....
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

GRAU

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții.....

3 LARVE V3/MP – LA LOTURILE SEMINCERE
5 LARVE V3/MP – LA LOTURILE DE CONSUM

.....
Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. FASTER 10 CE – 150 ml/ha sau
2. DECIS 25 WG – 30,0 g/ha sau
3. SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD) – 0,2 l/ha sau
4. KARATE ZEON (NINJA) – 0,15 l/ha sau
5. ALFAMETRIN 10 EC (ALFADONE 10 EC) – 0,10 l/ha

sau alte produse omologate recomandate in lista oficiala
PEST-EXPERT – <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola este quest)

Alte recomandari: Tratamentul chimic se va termina in 4 – 5 zile.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare respectiv: Ordonanta Guvernului nr. 4/1995, Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si nr. 127/21.10.1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine.

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 27 din 07.06.2021

Conditiiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii
GANDACUL BALOS AL OVAZULUI (LEMA MELANOPUS) - LARVE

.....
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

GRAU, ORZ, ALTE CEREALE PAIOASE

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:.....

PESTE 250 LARVE / MP

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, dupa caz:

1. FASTER 10 CE – 0,1 l/ha sau
2. KAISO SORBIE 5 EG (REXARIS – a doua denumire comerciala) – 0,15 kg/ha sau
3. SUMI ALPHA 5 EC (WIZARD) – 0,2 l/ha sau
4. KARATE ZEON (NINJA) – 0,15 l/ha

sau alte produse omologate recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT –
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola este **quest**)

Alte recomandari: Tratamentul se poate aplica si in vetre de atac.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislatia nationala in vigoare respectiv: Ordonanta Guvernului nr. 4/1995, Ordonanta Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si nr. 127/21.10.1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine.

BULETIN DE AVERTIZARE

PLOIESTI
NR. 28 din 07.06.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii
DIFERITE BOLI LA FLOAREA – SOARELUI: Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu),
Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Phomopsis helianthi (frangerea tulpinilor),
Plasmopara helianthi (mana florii soarelui)

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile.....

FLOAREA - SOARELUI

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții.....

TRAT. 1 – în stadiul de 6 – 8 perechi de frunze
TRAT. 2 – după înflorit, la formarea calatidiului

Folositi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. PICTOR (FILAN SC) – 0,5 l/ha (2 tratamente în vegetație) sau
2. TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha sau
3. AMISTAR GOLD - 1,0 l/ha sau
4. MIRAGE 45 EC – 1,0 l/ha sau
5. TANOS 50 WG – 0,4 kg/ha

sau alte produse omologate recomandate în lista oficială PEST-EXPERT –
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola este **quest**)

Alte recomandări: Dacă se constată atac de daunatori, se adaugă un insecticid omologat. La depistarea **manei florii soarelui (Plasmopara helianthi)** se recomandă eliminarea plantelor cu simptome de atac prin strangerea acestora în saci de plastic sau hârtie și distrugerea lor prin ardere.

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

In conformitate cu prevederile legale, se va respecta legislația națională în vigoare respectiv: Ordonanța Guvernului nr. 4/1995, Ordonanța Guvernului nr. 41/22.08.2007, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, nr. 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, nr. 15b/3404/08.11.1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și nr. 127/21.10.1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicărilor cu pesticide, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de "înflorire", pentru a asigura protecția familiilor de albine.

ATENTIE!!!

Agricultorii care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor au urmatoarele **obligatii**:

1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT;
2. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;
3. Sa se asigure ca produsele de protectie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin **autorizatie** pentru utilizarea acestor produse;
4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii;
5. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatarele agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectie a plantelor*, elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara;

Cerinte obligatorii pentru fermieri: Conform Hotararii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesionisti de produse de protectie a plantelor au obligatia sa pastreze pentru o perioada de cel putin 3 ani, evidenta produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza.

In registrul in care tin evidenta produselor de protectie a plantelor se va specifica:

- denumirea produsului de protectie a plantelor;
- momentul aplicarii;
- doza utilizata;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protectie a plantelor.

La cerere, utilizatorii profesionisti pun la dispozitia inspectorilor fitosanitari informatiile relevante din evidentele respective.

Nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotararii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Va alaturam mai jos modelul de REGISTRU pentru evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor.